
Truite brune



Le corps de la truite brune est pâle avec des taches foncées, contrairement à celui de l'omble de fontaine, qui est foncé avec des taches pâles.

Omble de fontaine



Distinction

L'omble de fontaine se distingue des autres salmonidés par :

- **ses points rouges bordés d'un halo bleu bien défini sur son corps;**
- **ses marbrures sur le dos, la nageoire dorsale et la nageoire caudale;**
- **ses nageoires pectorales et pelvienne bordées d'une bande blanche suivie d'une bande noire.**

Truite arc-en-ciel



La truite arc-en-ciel se distingue par des taches sombres sur fond pâle. Sa nageoire caudale se caractérise par des rangées régulières de taches noires alors que sa nageoire adipeuse possède une bordure noire.

***** Attention, ensemencement de 5 000 Ouananiche par le ministère a Gosford en 2026*** (Ne pas divulguer pour éviter les curieux)**

La truite arc-en-ciel a :

- nageoire caudale avec rangées régulières de taches noires;
- nageoire caudale carrée ou légèrement fourchue;
- nageoire adipeuse avec bordure noire et quelques taches noires.

La truite brune a :

- nageoire caudale avec taches foncées occasionnelles et peu définies, jamais en rangée régulières;
- nageoire caudale carrée (légèrement fourchue chez les jeunes);
- taches foncées sur la nageoire adipeuse.

Le saumon atlantique et la ouananiche ont* :

- nageoire caudale rarement tachetée de points noirs;
- nageoire caudale remarquablement fourchue chez les jeunes, légèrement chez les adultes;
- absence de taches sur la nageoire adipeuse.

*Le saumon atlantique et la ouananiche sont la même espèce. La seule différence réside dans le fait que la ouananiche demeure en lac, alors que le saumon atlantique migre en mer pour une partie de son cycle vital.

